

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



BRETAGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°19 du 28 juillet 2004 - 2 pages

Cultures Légumières

lutte raisonnée

ARTICHAUT

PUCERONS

COTES D'ARMOR

Les populations de pucerons verts et noirs sont quasi absentes sur l'ensemble de la zone de production.
Le parasitisme (pucerons momifiés et mycosés) est lui aussi quasi inexistant.
Cette semaine encore, les prédateurs sont toujours observés en nombre important dans les parcelles. On note des coccinelles, des punaises anthocorides et des œufs et adultes de chrysopes.
Les populations de pucerons étant globalement à un niveau peu inquiétant et compte tenu d'une forte présence de prédateurs, un traitement insecticide est inutile.

FINISTERE

Les populations de pucerons verts sont toujours très faibles voire inexistantes.
Les pucerons noirs sont en légère baisse et globalement peu présents.
Le parasitisme (surtout pucerons mycosés) reste légèrement actif selon l'infestation constatée et les adultes de prédateurs (syrphes et chrysopes) sont remarqués.
Compte tenu des observations, aucune intervention insecticide n'est justifiée. Les faibles populations de pucerons devraient être régulées par le parasitisme et la prédation.

CHOU

MOUCHE DU CHOU - PUCERONS

LEPIDOPTERES

COTES D'ARMOR

L'activité des mouches du chou diminue cette semaine avec une moyenne des pontes de 5.6 œufs par pied.
Concernant les autres ravageurs, la situation est calme pour l'instant.
Aucune intervention n'est nécessaire concernant la mouche du chou ou les autres ravageurs.

FINISTERE

La moyenne des pontes de mouche du chou est redescendue cette semaine autour de 5.8 œufs par pied. Le deuxième vol semble se terminer.
Les pucerons et chenilles sont peu remarqués.
Aucune intervention n'est nécessaire concernant la mouche du chou ou les autres ravageurs.



ILLE ET VILAINE

Sur l'ensemble du département, l'activité des mouches du chou régresse cette semaine avec une moyenne de ponte de 1.7 œufs/pied.
Concernant les autres ravageurs, la situation est calme pour le moment. Seules quelques petites colonies de chenilles de piérides émergent localement.
Aucune intervention n'est nécessaire concernant la mouche du chou ou les autres ravageurs.



Prochain bulletin : 03 Août 2004




Artichaut :
Pucerons verts et noirs peu présents. Prédation active.

Chou :
Second vol des mouches du chou en cours d'achèvement.


02421000138000022 30202

DRAF Bretagne
Service Régional de la Protection des Végétaux
280, rue de fougères
35700 RENNES

Imprimé à la station d'Avertissements Agricoles de Rennes
Directeur gérant : P. MICHON
Publication périodique
C.P.P.A.P n°528 AD
ISSN n°1167-2382






graphique des pontes de mouche du chou
Année 2004 - Ille et Vilaine, Finistère et Côtes d'Armor.
nombre moyen d'oeufs/pied
30
25
20
15
10
5
0
seuil de
nuisibilité
13/4
27/4
11/5
25/5
8/6
22/6
6/7
20/7
Ille et Vilaine
Finistère
Côtes d'Armor